

1076. 有限階ノベクトル束ニツイテ

栗田 總 (ハ部)

中山 正 (名大)

Birkhoff, *Lattice theory*, 本ノ終末, *unsolved problems*, (6), スナハチ有限階ノベクトル束ノ型ヲスツカリヤマトイフ問題ヲ解決シテミタイト思ヒマス。同書以後ノベクトル束ノ理論ノ発展。特ニ *Lorenzen-Clifford* ノ定理等カラ見レバ今トナツテハ容易ト問題トイフベキカモ知レマセンガ, トモカク書イテ見マス。答ハ、同書 120 頁ニモ豫想シテアリマスヤウニ直和ト同書式ノ組合ニテ順次賓数群カラ組立テラレコトデアリマス。

添シクイハバ、先ツ一ツノベクトル束 ∇_1, ∇_2 カラ直和トシテ一ツノベクトル束が得ラレル。コレヲ

$$\nabla_1 + \nabla_2$$

ヲ表ハス。コトヲ特ニ ∇_1 が線型順序ヲモツ場合ニハ (a_1, a_2) ($a_1 \in \nabla_1, a_2 \in \nabla_2$) ナル組ノ間ノ順序ヲイハユル辭者式 $(a_1, a_2) > (b_1, b_2)$ トハ $a_1 > b_1$ ナルカ、又ハ $a_1 = b_1, a_2 > b_2$ ナルコトトシテ矢張り一ツノベクトル束ヲ得ル。コレヲ假ニ

$$\nabla_1 \otimes \nabla_2$$

ヲアソビハルコトヲヨウ。マタ実数ノナスベクトル束を R ナ表ハサウ。シカラバ任意ノ有限次元 (階) ノベクトル束 ∇ ハソレヨリ低イ次元ノベクトル束 ∇_1, ∇_2 カラ直和トシ

テ

$$\nabla = \nabla_1 + \nabla_2$$

トシテ得ラレルカ、マタハヤハリ低イ次元ノ ∇_1 カラ

$$\nabla = R \otimes \nabla_1$$

トシテ得ラレル。コレヲ順次ニ有限階ノベクトル束ノ型ガ入ッカリキスルヲケダザル。

証明: ∇ ヲ有限次元ノベクトル束トスル。Lorenzgen-Lieffers の定理ニヨリ ∇ ハイツツカノ線型順序ノベクトル束 L_0 ノ直和ノ中ニ束解法ニ合メテ同型ニ寫像サレル。 ∇ が有限次元ガカラコノ際有限個ヲ足リル。マタ L_0 ニ有限次元ナルトシテヨイ。

$$\nabla \subseteq L_1 + L_2 + \dots + L_n$$

各 L_i は有限次元ノ線型ベクトル空間トシテ $R \otimes R \otimes \dots \otimes R$
 ナル形ヲモツ。今 $L_i = R \times R \times \dots \times R$ (k_i 個) トスル。
 即チ L_i ハ $(d_1, d_2, \dots, d_{k_i})$ ノ全体ヲイフ。ユコニ等
 書式ニ順序ルツイヲオスル。

$x \in \nabla$, L_i - 成分ヲ

$$x_i = (d_{i1}(x), d_{i2}(x), \dots, d_{ik_i}(x))$$

ヲ表ハサウ。ユコニ等 x ガ ∇ ヲウゴクトキ x_i ハ L_i ノ全体
 ヲウクルトシテ一般性ヲ失ハナイ。

補題 1. $i \neq j$ トスル。而シテ

$$(\xi) \quad d_{i1}(x) > 0, \quad d_{j1}(x) < 0$$

ナラザルコトヲ示スル (コレハ $-x$ ヲ考ヘレバワカル様ニ $< 0, > 0$ ガオコラナイトイフニ同等)。シカラバ

$$(*) \quad d_{i1}(x) > 0, \quad d_{j1}(x) = 0$$

ナラコトモナイ。

証明: 假ニ $(*)$ ナル x ガアルトスル。 x_j ハ L_j 全体
 ヲウゴクカラ、 $d_{j1}(y) < 0$ ナル $y \in \nabla$ ガアル。必毎ナラ
 バ適當ニ係數 α ヲ考ヘレバワカル如ク、ユコニ

$|d_{i1}(y)| < d_{i1}(x)$ ト假定シテオコハナイ。然ラバ

$$d_{i1}(x+y) > 0, \quad d_{j1}(x+y) < 0$$

トナラテ矛盾。

定義 i, j ニ於テ (ξ) ナル x ガ (ξ ヲイフ) ナル x

ε) 存在シナイトキ番号 i, j の 関連スル トヨブユトニシヨウ。

コノ関係ハ同値律ヲミタス。

補題 2. i, j が関連スルトスル。然ラバ $\alpha_{i1}(x)/\alpha_{j1}(x)$ ハ x = 無関係 = 一定デアール (不定形 $0/0$ 1 場合ヲイゾク)

証明: $\alpha_{i1}(x)\alpha_{j1}(y) - \alpha_{i1}(y)\alpha_{j1}(x) > 0$ デアールトスル。

而シテ $\alpha_{i1}(x) > 0$ トスル。然ラバ

$$Z = (\alpha_{j1}(y) - \epsilon)x - \alpha_{j1}(x)y$$

= 於テ $\epsilon > 0$ が充分小+ラバ $\alpha_{i1}(Z) > 0$, $\alpha_{j1}(Z) < 0$
トナツテ矛盾

ナリ

Case I. スベテ, $1, 2, \dots, n$ が互=関連シテキル場合:

コノ場合スベテノ $\alpha_{i1}(x)$ ハ同時 = 0 デアール。今 $\alpha_{11}(x)$, シタガツテスベテノ $\alpha_{i1}(x)$ が 0 ナル x 全体ヲ ∇_1 トスル。 ∇_1 ハ normal subspace ナリ,
 $\alpha_{11}(x) \neq 0$ = 對シテハ

$$\alpha_{11}(x) : \alpha_{21}(x) : \dots : \alpha_{n1}(x)$$

ガ一定ナルコトカラ ∇/∇_1 ハ実数域 R デアール。而シテ $\alpha_{11}(x) > 0$ ナラバ $x > 0$ 。コレヨリ

$$\nabla = R \otimes \nabla_1$$

デアウ.

Case II. 互=関連 r ノイ=番号ガアルトキ.

ユノトキ, $1, 2, \dots, r$ ガ互=関連シ, $r+1, r+2, \dots, n$ ガソレヲ=関連シトイト假定スル. i ヲ $r+1, \dots, n$ ノドレカトスレバ

$$d_{ii}(x) > 0, \dots, d_{r1}(x) > 0, d_{i1}(x) \leq 0$$

ナル x ガアル. ソノ一ツヲ $x^{(i)}$ トスル. $z = x^{(r+1)} \wedge \dots \wedge x^{(n)}$ トカテバ

$$d_{ii}(z) > 0, \dots, d_{r1}(z) > 0,$$

$$d_{r+1,1}(z) \leq 0, \dots, d_{n1}(z) \leq 0$$

デアウ. 更= $Z = z \wedge 0$ トスレバ

$$d_{ii}(Z) > 0, \dots, d_{r1}(Z) > 0,$$

$$d_{r+1,1}(Z) = \dots = d_{n1}(Z) = 0$$

デアウ. 類似ノ論法=ヨリ

$$d_{ii}(w) = \dots = d_{r1}(w) = 0,$$

$$d_{r+1,1}(w) > 0, \dots, d_{n1}(w) > 0$$

ナル w ガアル.

然ラバ \forall ノ任意ノ元 $v =$ 對シテ d ヲ充分大=トスレバ $v' = -dZ \cup (v \wedge dZ)$ ハ v ト L_1, \dots, L_r 成分ガ同ジテ L_{r+1}, \dots, L_n 成分ガスベテ 0 , $v'' = -dw \cup (v \wedge dw)$ ハ丁度 v ノ反對ノ關係=ナリテアル. v ガシテ $v = v' + v''$ デアウ.

ヨリテ L_{r+1}, \dots, L_n 成分ガ 0 ナル元ノ全体ヲ \mathcal{V}' ト

シ、 L_1, \dots, L_r 成分がヲカルヲ ∇'' トスレバ群ト
 シテ $\nabla = \nabla' + \nabla''$ トナルガ、 $v \geq 0$ ナルタメニハ $v' \geq 0$,
 $v'' \geq 0$ が必要且ツ充分ナコト明カダカラベクヒ百束
 ノ意味ヲ

$$\nabla = \nabla' + \nabla''$$

トナル。

— 証明終 —

ナホ、2次元 (コレハ簡單) 及ビ3次元ノ場合ハ正元ノ
 ナス cone ノ形ヲ幾何學的ニ分析スルコトニヨツテ同ジ結
 果ガ得ラレル。同様ノ方法ヲ一般ノ次元ニ行クカモ知レナ
 イガ、大分面倒ニヨツテヨクワカラナイ。

— 以 上 —